

Brassicas forrajeras, **una alternativa** frente a la escasez de forraje



Ministerio de
Agricultura

Gobierno de Chile



		NABO	RUTABAGA	RAPS	COL
	Dosis (kg de semilla/ha)	1 - 3	0,8 - 1,5	3-4	3-4
	Fecha de siembra	Noviembre - Diciembre	Septiembre - Comienzo de Octubre	Septiembre	Siembras tempranas en primavera
V a r i e d a d e s	Z. Estepa	Blanco de Lugo, Green Globe, Marco, York Globe	Winton, Dominion, Highlander, Major Plus	Goliath, Winfred	
	Z. Intermedia	Civasto, Green Globe, Barkant, Cuello de Violeta	Winton, Dominion	Goliath, Winfred, Interval	
	Z. Húmeda o de Transición	Civasto, Cuello de Violeta Balance	Winton, Highlander, Major Plus	Goliath, Interval	Caledonian, Rawara, Regal, Soberana

Cuadro 2. Recomendaciones para el establecimiento de brassicas forrajeras en la Región de Aysén.

de los nutrientes, ayudando a reducir a la vez, la predominancia de algunas malezas. Al momento de la siembra es importante que la semilla quede bien distribuida, las dosis de siembra en general no supera los 5 kg/ha. La profundidad de siembra no debe ser mayor a 2 cm, con una rastra liviana o una pasada de rodillo será suficiente.

¿Cómo se utilizan las brassicas forrajeras?

Las brassicas forrajeras pueden alcanzar altos rendimientos, con alto valor nutritivo, tanto en contenido proteico (13 - 22%) como energético (2,6 - 3,1 Mcal/kgMs). Se puede utilizar para alimentación ganado bovino y ovino, teniendo en ambos favorables resultados en ganancia de peso. El pastoreo se debe realizar en forma controlada, para obtener la mayor eficiencia en la utilización del cultivo, para ello se recomienda el uso de cerco eléctrico móvil que permite dosificar una cierta cantidad de pastoreo para cada día. Las brassicas tienen un contenido muy bajo de fibra, por lo que es necesario equilibrar la dieta con heno, silo o pradera, para suplir la fibra que el animal necesita, y así evitar problemas de salud. Este último punto es importante, especialmente cuando se comienza a incluir este tipo de alimento a la dieta, se debe hacer de forma gradual, para que la microflora ruminal pueda adaptarse a este alimento de alta calidad.



Figura 2. Pastoreo en franja de brassicas forrajeras.

INIA más de 50 años
aportando al sector agroalimentario nacional

Más Informaciones:

INIA TAMEL AIKE / Las Lengas 1450, Casilla 296,
Coyhaique, Región de Aysén - Patagonia

